

24/06/2020

Galgos 112 Malaga Norte

Estimad@ Francisco

**Re: Helio de Galgos 112, un galgo español.**

**Motivo de la Visita**

Valoración y tratamiento de heridas de duración desconocida, en la extremidad anterior izquierda.

**Exploración**

En el momento de la visita inicial Helio presenta un estado lamentable, anoréxico, con mucha pérdida de peso y masa muscular, y con unas heridas múltiples que se propagan desde la extremidad distal hacia la región del codo, con una miasis y centenares de larvas asociadas anidando dentro de las heridas. Se realiza una anestesia general que permite el lavado y cuidado inicial de las heridas incluyendo la retirada de las larvas, y se realiza un estudio radiográfico. Se observan zonas de hueso expuesto a nivel del radio y falanges distales de los dedos II y V, no apreciándose en el estudio radiográfico ninguna fractura de interés. Es imposible valorar el daño asociado a los tendones y estructuras ligamentosas, debido a la presencia de las heridas que presenta.

**Comentario**

Hemos ido sometiendo a Helio a un cambio diario de vendaje, y las heridas en principio están evolucionando de forma satisfactoria. La ausencia de fracturas hace que merezca la pena y mucho, continuar con el tratamiento de las heridas hasta su cicatrización definitiva, lo que requerirá de cambios de vendaje continuos, durante las próximas semanas. Evidentemente existe el riesgo de una posible infección y un retraso en la cicatrización, que nos obligue a plantear una amputación, aunque en un principio esto parece poco probable. Helio necesitará venir a consulta cada 2 días para cambios de vendaje durante las próximas semanas, hasta que podamos tener totalmente controlada dichas heridas. El pronóstico a largo plazo es reservado, porque habrá que esperar a ver la evolución de dichas heridas, y el estado funcional de la extremidad distal, con respecto a la pérdida de tendones y ligamentos, que se presupone por la magnitud de las heridas. Es posible que sea necesario realizar una artrodesis de carpo en el futuro, pero habrá que esperar como te digo la evolución de las heridas. Helio debe de tomar Amoxicilina Clavulánico 20 mg/kg, 2 veces al día, y Meloxicam 0,1mg/kg, 1 vez al día, de forma ininterrumpida.

No dudes en contactar conmigo si tienes alguna duda. Te mantendré informado de acontecimientos.

Recibe un cordial saludo,

Carlos Macías Oliva DSAS(Orthopaedics)  
Diplomado Británico en Cirugía  
RCVS Specialist in Surgery

Juan Miguel Ramírez León  
LV Dipl. ECVS  
Especialista Europeo en Cirugía de Pequeños Animales  
European Veterinary Specialist in Small Animal Surgery